

www.racchangins.ch

Station fédérale de recherches agronomiques
de Changins

Christian Bohren, CP 1012, 1260 Nyon 1

L'ambroisie (*Ambrosia artemisiifolia* L.)

une plante dangereuse !



La plante

Les pollens de l'ambroisie sont très allergènes. Ils provoquent des rhinites, des conjonctivites et, chez environ 25 % des sujets allergiques, des crises d'asthme. Ces pollens, très petits, pénètrent profondément dans les poumons et peuvent y causer une inflammation ou un œdème de la muqueuse bronchiale.

(source: Bulletin OFSP 30/05)

La plante commence sa croissance dès fin avril et dissémine son pollen entre la mi-août et octobre. La plante pousse sur tous les types de sols ouverts : sur les terrains riches, elle peut atteindre une grande taille (> 1m), mais elle reste plus modeste sur des sols moins fertiles.

Localisation

- ◆ Dans les jardins privés
- ◆ Le long des voies de communication
- ◆ Dans des champs ou gravières contaminés

Dissémination

- ◆ Avec les graines pour oiseaux
- ◆ Avec les transports de terre ou de gravier
- ◆ Par les outils de travail du sol



Moyens de lutte

Rechercher systématiquement les pousses d'ambroisie dans le jardin entre juin et août, en particulier là où de la nourriture pour oiseaux a été répandue.

Arracher les plantes avec la racine (en portant des gants) ; pendant la floraison, un masque respiratoire est recommandé.

Déposer les plantes arrachées avec les ordures ménagères, en aucun cas avec les déchets verts, le compost ou le fumier.

Attention : coupée à la base de la tige, la plante développe rapidement de nouvelles branches florales.

Communiquez votre observation !

... et transmettez-la au Service phytosanitaire de votre canton.

Adresses sous www.racchangins.ch

Dossiers spéciaux: Ambroisie

Merci !

Avec le soutien de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) et de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP)

09.2005